# Fluff Test

## 身体への探索｜実施・部位別記録

C＝病巣反対側 I＝病巣同側。本人の左右と病巣との関係を確認して記入。

| | |
|---|---|
| 氏名・ID： | 評価日： 評価者： |
| 病巣側：右・左 | 探索する手：右・左 |
| C側：右・左 I側：右・左 | 座位・支持・材料： |

## 1｜準備 → 探索 → 終了確認

① 説明・理解、感覚、痛み、到達範囲、座位の安定を確認。
② 遮眼してから衣服に標的を装着。位置・総数を伝えない。
③ 同側の手で全ての標的を取り外してもらう。場所は誘導しない。
④ 本人の終了判断で残存位置を確認。誘導後の回収は別記する。

標準条件：直径約2cmの円形標的、全24個。固定の制限時間なし。安全に探索できないときは中断理由を記録。探索時間は補助記録として扱う。

## 2｜部位別に数える

回収数／残存数を記入。探索する同側上肢には標的を置かない。

| 部位 | C配置数 | C 回収／残存 | I配置数 | I 回収／残存 |
|---|---|---|---|---|
| 上腕 | 3 | ／ | — | — |
| 前腕 | 3 | ／ | — | — |
| 体幹前面 | 3 | ／ | 3 | ／ |
| 大腿 | 3 | ／ | 3 | ／ |
| 下腿 | 3 | ／ | 3 | ／ |
| 合計 | 15 | ／ | 9 | ／ |

回収＋残存：C＝15、I＝9になることを確認。脱落・装着漏れは別記し、成立条件を確認。

## 3｜終了時の様子

| | |
|---|---|
| 探索時間・中断理由 | |
| 触れなかった部位 | |
| 触れたが外せなかった部位 | |
| 本人の終了発言 | |

場面図は概念図です。標的の配置・実施条件は原資料もご確認ください。出典リンクは3ページ目。

# 採点｜原法と改訂法を分ける

氏名・ID：_____ 評価日：_____

## 1｜原法：病巣反対側の回収数

C＝_____／15個 12個以下（3個以上残存）：原法の基準に該当。

13個回収はこの基準に該当しません。原法の判定と改訂法の分類は別々に記録。

## 2｜改訂法：左右の回収率差

D＝100 × C／15 − 100 × I／9

C回収数：_____ I回収数：_____ D：_____ パーセントポイント

C≧13かつI≧8は正常範囲。その外側を左右差と全体低下で分類。負のDは反対側、正のDは同側の回収率が低い方向。

### 回収率差の換算表｜行＝C、列＝I

| C / I | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.0 | -11.1 | -22.2 | -33.3 | -44.4 | -55.6 | -66.7 | -77.8 | -88.9 | -100.0 |
| 1 | 6.7 | -4.4 | -15.6 | -26.7 | -37.8 | -48.9 | -60.0 | -71.1 | -82.2 | -93.3 |
| 2 | 13.3 | 2.2 | -8.9 | -20.0 | -31.1 | -42.2 | -53.3 | -64.4 | -75.6 | -86.7 |
| 3 | 20.0 | 8.9 | -2.2 | -13.3 | -24.4 | -35.6 | -46.7 | -57.8 | -68.9 | -80.0 |
| 4 | 26.7 | 15.6 | 4.4 | -6.7 | -17.8 | -28.9 | -40.0 | -51.1 | -62.2 | -73.3 |
| 5 | 33.3 | 22.2 | 11.1 | 0.0 | -11.1 | -22.2 | -33.3 | -44.4 | -55.6 | -66.7 |
| 6 | 40.0 | 28.9 | 17.8 | 6.7 | -4.4 | -15.6 | -26.7 | -37.8 | -48.9 | -60.0 |
| 7 | 46.7 | 35.6 | 24.4 | 13.3 | 2.2 | -8.9 | -20.0 | -31.1 | -42.2 | -53.3 |
| 8 | 53.3 | 42.2 | 31.1 | 20.0 | 8.9 | -2.2 | -13.3 | -24.4 | -35.6 | -46.7 |
| 9 | 60.0 | 48.9 | 37.8 | 26.7 | 15.6 | 4.4 | -6.7 | -17.8 | -28.9 | -40.0 |
| 10 | 66.7 | 55.6 | 44.4 | 33.3 | 22.2 | 11.1 | 0.0 | -11.1 | -22.2 | -33.3 |
| 11 | 73.3 | 62.2 | 51.1 | 40.0 | 28.9 | 17.8 | 6.7 | -4.4 | -15.6 | -26.7 |
| 12 | 80.0 | 68.9 | 57.8 | 46.7 | 35.6 | 24.4 | 13.3 | 2.2 | -8.9 | -20.0 |
| 13 | 86.7 | 75.6 | 64.4 | 53.3 | 42.2 | 31.1 | 20.0 | 8.9 | -2.2 | -13.3 |
| 14 | 93.3 | 82.2 | 71.1 | 60.0 | 48.9 | 37.8 | 26.7 | 15.6 | 4.4 | -6.7 |
| 15 | 100.0 | 88.9 | 77.8 | 66.7 | 55.6 | 44.4 | 33.3 | 22.2 | 11.1 | 0.0 |

緑＝正常範囲 赤系＝反対側の偏り 青系＝同側の偏り 白＝NSU候補

NSU：両側の成績が低く、明確な左右の偏りがない状態。理解・全般性注意・到達の制約などを確認します。D＝0でも全回収とは限りません。

表は回収数から算出し小数1桁で表示。±13.3の境界では丸め前の値だけで分類を変えず、原著Table 2の該当セルを照合してください。

改訂法の分類：正常範囲・反対側PN・同側PN・NSU ／ 照合：済・未

原法との違い・解釈：_____

PN＝半側身体無視。換算・分類の根拠：Cocchini & Beschin（2022）Table 2。

# 生活場面と支援の記録

追加の臨床観察／検査の回収数には加算しません。

## 1｜検査の結果を生活で確かめる

| | |
|---|---|
| 場面 | 更衣・清拭・移乗前の手足確認・その他_____ |
| 残った部位／生活上の支障 | |
| 運動・感覚・痛み・理解の影響 | |

## 2｜支援を一つ試し、変化を記録

| | |
|---|---|
| 試した手がかり・環境調整 | |
| 自分で確認できた部位・促し回数 | |
| 次回：減らす促し／そろえる条件 | |

## 3｜カルテ・申し送り

C/I回収数 → 採点法 → 残存部位と探索行動 → 条件 → 生活の支障 → 支援前後。

## 出典・実施資料

Cocchini G, et al. The Fluff Test. Neuropsychol Rehabil. 2001;11:17–31.
Cocchini G, Beschin N. Improved scoring system. 2022;32:69–83. 著者公開稿
太田久晶．半側空間無視のみかた．神経心理学．2025;41:80–87.
Priftis K, et al. Front Hum Neurosci. 2013;7:360. 実施条件

STROKE LAB：日本語説明・記録欄・レイアウトを編集。実施・採点の詳細は原資料をご確認ください。